

TABLA I
LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS FORMULABLES COMO PRINCIPIOS ACTIVOS (Abril 2024)

ESTÁN EXCLUIDOS TODOS LOS PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS QUE CONTENGAN CORTICOIDES, ANESTÉSICOS, ANTIBIÓTICOS Y ANTISÉPTICOS ETC, CON EXCEPCIÓN DE LOS ANTIFÚNGICOS

ESTÁN EXCLUIDOS TODOS LOS ANTIVIRALES, ANTIHEMORROIDALES Y AINES POR VÍA TÓPICA

| NOMBRE | OBSERVACIONES | APORT. | PRECIO €/G |
|--|--|--------|------------|
| ACEITE DE CADE = aceite de enebro = brea de enebro | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,120 |
| ACEITE DE ENEBRO = aceite de cade = brea de enebro | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,120 |
| ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,088 |
| ALOPURINOL | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 3,400 |
| ALQUITRÁN DE HULLA = brea de hulla = coaltar | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,138 |
| AMIODARONA, CLORHIDRATO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 7,423 |
| AMITRIPTILINA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 6,850 |
| AMLODIPINO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 43,642 |
| ATENOLOL | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 2,680 |
| AZUFRE | Vía tópica para el tratamiento de la sarna | N | 0,082 |
| BACLOFENO | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 11,290 |
| BETAMETASONA, DIPROPIONATO | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a queratolíticos, en concentraciones hasta el 0,2% | N | 34,143 |
| BICARBONATO, SODIO | Vía oral en insuficiencia renal | N | 0,014 |
| BIOTINA = vitamina H | Como monofármaco, vía oral | N | 7,169 |
| BÓRICO, ÁCIDO POLVO | Para uso otológico al 5% (a saturación) | N | 0,043 |
| BREA ENEBRO = aceite de cade = aceite de enebro | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,120 |
| BREA HULLA = alquitrán de hulla = coaltar | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,138 |
| BUDESONIDA | | N | 88,143 |
| CALCIO, CARBONATO PRECIPITADO | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,077 |
| CALCIO, GLUCONATO | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,088 |
| CAPTOPRILO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 13,477 |
| CARBAMAZEPINA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 1,686 |
| CARVEDILOL | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 10,75 |
| CIANOCOBALAMINA = vitamina B12 | Como monofármaco, vía oral en dosificación pediátrica | N | 36,450 |
| CÍTRICO, ÁCIDO | Asociado a citrato potásico, vía oral en solución pediátrica | N | 0,086 |
| CLOBETASOL PROPIONATO | Para psoriasis, en concentraciones hasta el 0,05% asociado a queratolíticos | N | 31,412 |
| CLONIDINA, CLORHIDRATO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 87,510 |

| NOMBRE | OBSERVACIONES | APORT. | PRECIO €/G |
|--|--|--------|--------------|
| COALTAR = alquitrán de hulla = brea de hulla | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,138 |
| COBRE, SULFATO POLVO | Vía tópica | N | 0,117 |
| CROMOGLICATO, SODIO | Vía oral, para mastocitosis sistémica (Tasación en función del precio de compra) | R | 2,86 - 3,815 |
| DEXAMETASONA | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 19,730 |
| DILTIAZEM, CLORHIDRATO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 5,600 |
| | Vía tópica al 2% para fisuras anales | N | |
| DIPIRIDAMOL | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,132 |
| ENALAPRILLO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 6,900 |
| ESPIRONOLACTONA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 6,400 |
| ETAMBUTOL | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 1,182 |
| ETINILESTRADIOL | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 86,480 |
| FENOBARBITAL | Como monofármaco vía oral en dosificación pediátrica | R | 3,543 |
| FLECAINIDA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 7,450 |
| FLUOCINOLONA, ACETÓNIDO | Para psoriasis, asociado a queratolíticos en concentraciones hasta 0,025% | N | 53,070 |
| FLUOROURACILO | Vía tópica hasta el 5% | R | 7,925 |
| FÓLICO, ÁCIDO | Como monofármaco, vía oral en dosificación pediátrica | N | 2,320 |
| FOSFORICO, ÁCIDO 85% | Vía oral en solución pediátrica, para elaboración de Solución Joulie | N | 0,085 |
| FUROSEMIDA | Vía oral en solución pediátrica | R | 3,055 |
| HIDROCLOROTIAZIDA | Vía oral en solución pediátrica | R | 1,320 |
| HIDROCORTISONA BASE | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 8,626 |
| ICTAMOL = ictiol | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,515 |
| ICTIOL = ictamol | Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos | N | 0,515 |
| INDOMETACINA | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,830 |
| iodo METALOIDE | Vía sistémica monofármaco o asociado IK | N | 0,340 |
| ISONIAZIDA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 1,290 |
| ISOTRETINOÍNA = retinoico, ácido (13-cis) | Vía oral (visado), en pacientes alérgicos al aceite de cacahuete y/o soja | N | 40,287 |
| IVABRADINA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | (*) |
| KELLINA | Vía tópica para el tratamiento del vitiligo en concentraciones del 0,1% al 4% | N | 4,450 |
| LEVAMISOL | Vía oral en dosificación pediátrica, para síndrome nefrótico | N | 0,600 |
| LEVODOPA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 5,589 |
| LEVOTIROXINA = tiroxina | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 43,164 |
| LOSARTÁN | Vía oral en dosificación pediátrica | R | (*) |
| METOXALENO = metoxipsoraleno 8 = 8 MOP | Vía tópica | R | 24,475 |
| METOXIPSORALENO-8 = metoxaleno = 8 MOP | Vía tópica | R | 24,475 |
| MORFINA, CLORHIDRATO | | R | 1,330 |
| NADOLOL | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 24,672 |
| NICOTINAMIDA = vitamina PP | Vía oral en cápsulas para tratamiento de penfingoide ampolloso y prevención del cáncer de piel no melanoma | N | 0,354 |
| NIFEDIPINO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 4,887 |
| NISTATINA | Como monofármaco | N | 1,905 |

| NOMBRE | OBSERVACIONES | APORT. | PRECIO €/G |
|---|--|--------|------------|
| NITROGLICERINA 2% | Vía tópica al 0,2% para fisuras anales | N | 2,750 |
| OMEPRAZOL BASE | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 16,600 |
| OXIBUTININA | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 12,790 |
| PANTOPRAZOL | Vía oral en dosificación pediátrica, cuando esté contraindicado el omeprazol | N | (*) |
| PILOCARPINA, CLORHIDRATO | Vía oftálmica, como colirio | N | 27,350 |
| PIRIDOXINA, CLORHIDRATO = vitamina B6 | Vía oral en dosificación pediátrica, como monofármaco o asociado a isoniazida | N | 0,907 |
| PIRIMETAMINA | Vía oral en dosificación pediátrica, en toxoplasmosis congénita | R | (*) |
| POTASIO, CITRATO | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,102 |
| POTASIO, IODURO | Vía oral | N | 0,407 |
| PREDNISOLONA | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 7,493 |
| PROPAFENONA | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 5,459 |
| PROPRANOLOL | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 2,318 |
| RETINOICO, ÁCIDO (13-CIS) = isotretinoína | Vía oral (visado), en pacientes alérgicos al aceite de cacahuete y/o soja | N | 40,287 |
| RETINOICO, ÁCIDO TRANS= trans retinoico ácido = tretinoína = vitamina A ácida | Para psoriasis, asociado a un corticoide en concentraciones del 0,05% al 0,2% | N | 20,690 |
| RETINOL, ACETATO = vitamina A, acetato | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,897 |
| RETINOL, PALMITATO = vitamina A, palmitato | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,346 |
| RIBOFLAVINA= vitamina B2 | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,100 |
| SALICÍLICO, ÁCIDO | En concentraciones hasta el 10%, como monofármaco o asociado con un antipsoriásico | N | 0,25 |
| SODIO, HIPOSULFITO = sodio, tiosulfato = tiosulfato sódico | Vía tópica | N | 0,117 |
| SODIO FOSFATO DIBÁSICO | Vía oral en solución pediátrica, para elaboración de Solución Joulie | N | 0,064 |
| SODIO, TIOSULFATO = sodio hiposulfito = tiosulfato sódico | Vía tópica | N | 0,117 |
| SULFADIAZINA = sulfapirimidina | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,270 |
| SULFAPIRIMIDINA = sulfadiazina | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,270 |
| TACROLIMUS | Vía rectal, con visado | N | 377,330 |
| TIAMINA, CLORHIDRATO = vitamina B1 clorhidrato | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,038 |
| TIAMINA, MONONITRATO = vitamina B1 mononitrato | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,153 |
| TIMOLOL | Vía tópica en niños, para hemangiomas cuando no pueda utilizarse propranolol | N | 58,400 |
| TIOSULFATO SÓDICO = sodio, hiposulfito = sodio, tiosulfato | Vía tópica | N | 0,117 |
| TIROXINA = levotiroxina | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 43,164 |
| TOCOFEROL ACETATO 50% POLVO =vitamina E acetato 50% | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,882 |
| TOCOFEROL SUCCINATO = vitamina E succinato | Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,409 |
| TRETINOINA = Trans retinoico ácido =vitamina A ácida | Para psoriasis, asociado a un corticoide en concentraciones del 0,05% al 0,2% | N | 20,690 |
| TRIAMCINOLONA, ACETÓNIDO | Para psoriasis como monofármaco o asociado a queratolíticos, en concentraciones del 0,025% al 0,5% | N | 17,376 |
| URSODESOXICÓLICO, ACIDO | Vía oral en dosificación pediátrica | N | 4,506 |
| VANCOMICINA | En colirio. En el tratamiento de la queratitis y endoftalmitis bacteriana | N | 7,580 |
| | Vía oral para infección por <i>Clostridium difficile</i> | | |
| VERAPAMILO | Vía oral en dosificación pediátrica | R | 4,933 |
| VITAMINA A, ACETATO | Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,897 |

| NOMBRE | OBSERVACIONES | APORT. | PRECIO €/G |
|---|--|--------|------------|
| VITAMINA A ÁCIDA = retinoico, ácido trans= trans retinoico ácido = tretinoína | Para psoriasis, asociado a un corticoide en concentraciones del 0,05% al 0,2% | N | 20,690 |
| VITAMINA A OLEOSA (palmitato) | | N | 10,750 |
| VITAMINA A, PALMITATO | Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,346 |
| VITAMINA B1 CLORHIDRATO = tiamina clorhidrato | Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,038 |
| VITAMINA B1 MONONITRATO = tiamina mononitrato | Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica | N | 0,153 |
| VITAMINA B2 = riboflavina | Como monofármaco vía oral en dosificación pediátrica | N | 1,100 |
| VITAMINA B6 = piridoxina | Vía oral en dosificación pediátrica como monofármaco o asociado a isoniazida | N | 0,801 |
| VITAMINA B12 = cianocobalamina | Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica | N | 36,450 |
| VITAMINA E ACETATO 50% polvo = tocoferol acetato 50% p | Como monofármaco en dosificación pediátrica | N | 0,882 |
| VITAMINA E SUCCINATO = tocoferol succinato | Como monofármaco en dosificación pediátrica | N | 0,409 |
| VITAMINA H = biotina | Como monofármaco vía oral | N | 7,169 |
| VITAMINA PP = nicotinamida | Vía oral en cápsulas para tratamiento de penfingoide ampolloso y prevención del cáncer de piel no melanoma | N | 0,354 |

Aport: Aportación

N: Aportación normal

R: Aportación reducida

(*) PA sin precio fijado: consultar con el CIM (948 222 111)

Abril 2024