

# Nervinex® (Brivudina)


## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE



¿Por qué ha recibido esta tarjeta?

Es muy importante que tome sus medicamentos de forma segura

Si toma Nervinex® junto a antineoplásicos, o el tiempo que pasa entre el fin del tratamiento con Nervinex® y la toma de antineoplásicos es inferior a cuatro semanas, puede sufrir efectos adversos muy graves, incluso mortales



- ▶ Nervinex® es un medicamento eficaz para el tratamiento precoz, en pacientes inmunocompetentes, del **herpes zóster o 'culebrilla'**, una enfermedad vírica caracterizada por la aparición de vesículas en la piel distribuidas en forma de *banda o cinturón*.
- ▶ Es seguro si se utiliza de forma adecuada, pero puede dar lugar a **efectos adversos graves** e, incluso, ocasionar la muerte cuando se administra junto a determinados medicamentos **antineoplásicos (5- fluoropirimidinas)**, o cuando el **intervalo de tiempo** entre la administración de Nervinex® y dichos medicamentos **es inferior a cuatro semanas**.
- ▶ Comente siempre al médico que le prescribe Nervinex® que está (o ha estado recientemente) en tratamiento con este tipo de antineoplásicos: son fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer (**Xeloda® , Capecitabina EFG, Utefos®, Fluorouracilo Accord i.v.**) o empleados en el tratamiento tópico de la queratosis actínica (**Actikerall® y fórmulas magistrales tópicas con 5-Fluorouracilo** ).

Anote la fecha de fin de tratamiento con Nervinex®, y presente esta tarjeta al facultativo especialista que le prescriba alguno de los medicamentos señalados

Fecha de fin de Nervinex®: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


No utilizar ninguno de los medicamentos señalados arriba antes de que hayan pasado cuatro semanas desde la fecha que ha apuntado

# Nervinex<sup>®</sup> (Brivudina)

## ¿Qué debe hacer para tomar Nervinex<sup>®</sup> de forma segura?



- ▶ Nervinex<sup>®</sup> (brivudina) puede ser peligroso si se utiliza con los antineoplásicos mencionados porque impide que éstos se metabolicen adecuadamente, por lo que se acumulan y su toxicidad aumenta mucho, hasta el punto de llegar a ser mortal. Esta interferencia se mantiene al menos durante cuatro semanas después del fin del tratamiento con Nervinex<sup>®</sup>.
- ▶ Por tanto, resulta **IMPRESINDIBLE** asegurar que:
  - No se toman simultáneamente ninguno de los antineoplásicos citados junto con Nervinex<sup>®</sup>.
  - La administración de un antineoplásico de este tipo no comienza antes de que hayan transcurrido cuatro semanas desde el fin del tratamiento con Nervinex<sup>®</sup>.
- ▶ Advierta siempre al facultativo que prescribe Nervinex<sup>®</sup> que toma o ha tomado alguno de los siguientes medicamentos:



Pomada de  
5 - FU

- ▶ Si se administra accidentalmente Nervinex<sup>®</sup> junto a alguno de los medicamentos citados, se interrumpirá la toma de ambos y se acudirá a Urgencias de forma inmediata.

**Consulte a su profesional de la salud si tiene dudas acerca de la administración de Nervinex<sup>®</sup>.  
Puede notificar todas las reacciones adversas en: [www.RAM.navarra.com](http://www.RAM.navarra.com)**