

ESTABILIDAD FUERA DE FRIGORÍFICO de vacunas indicadas en viajes internacionales, de dispensación en Oficina de Farmacia

PREVENCIÓN DE...	VACUNA	ESTABILIDAD POR ENCIMA DE 8°C
Cólera	DUKORAL®	14 días a < 25 °C ¹ (en su embalaje exterior; utilizar directamente o desechar)
	VAXCHORA®	12 horas a 25°C ¹ (en su embalaje exterior; utilizar directamente o desechar)
Dengue	QDENG A®	2h a < 32°C ¹ (una vez reconstituido el vial; utilizar directamente o desechar)
Difteria-Tétanos	DIFTAVAX®	Consultar al laboratorio (Sanofi) ²
Encefalitis Japonesa	IXIARO®	Consultar al laboratorio (PAXVAX) ²
Fiebre Tifoidea	TYPHIM VI®	Consultar al laboratorio (Sanofi) ²
	VIVOTIF®	24h a <25 °C ²
Hepatitis A	AVAXIM®	Consultar al laboratorio (Sanofi) ²
	HAVRIX 720 U® HAVRIX 1440 U®	72h a <25 °C ²
	VAQTA 25 U® VAQTA 50 U®	Consultar al laboratorio (MSD) ²
Hepatitis B	ENGERIX B® (10mcg; 20mcg)	168h a <25 °C ² 72h a <37°C ²
	HBVAXPRO® (5mcg; 10mcg)	72h a <25°C ²
Hepatitis A+B	TWINRIX® ADULTOS TWINRIX® PEDIATRICO	168 horas a <25 °C ²
Meningitis meningocócica ACYW-135	MENQUADFI®	72 h a < 25 °C ¹
	MENVEO®	120 h a < 25 °C ²
	NIMENRIX®	193 días a <25°C ² 30 días a < 37 °C ²

¹Ficha técnica del medicamento; ²Laboratorio fabricante