


Risperidona solución oral (1mg/ml)

(Risperdal[®], Risperidona EFG)

¿Qué debe SABER para usarla de forma segura?

**Esta información va dirigida a población pediátrica,
adolescentes y adultos de edad avanzada**




- ▶ En población pediátrica, y en adultos de edad avanzada, es frecuente el uso de risperidona en solución oral, empleando una jeringa o pipeta dosificadora (incluida en el envase) para medir la cantidad exacta de medicación pautada.
- ▶ Se han notificado casos de sobredosis accidental con risperidona solución oral, en niños y adolescentes, por errores en la interpretación de estos dosificadores.
- ▶ Debe tenerse en cuenta que las dosis utilizadas en población pediátrica y adultos de edad avanzada son dosis bajas (entre 0,25 mg y 2 mg).
- ▶ Los medicamentos disponibles en el mercado, a base de risperidona en solución oral, tienen una concentración de 1 mg/ml. Así, por ejemplo, para administrar 0,25 mg es preciso medir 0,25 ml.

Puede notificar las sospechas de reacciones adversas en: www.RAM.navarra.es

¿Qué debe HACER para usar risperidona solución oral de forma segura?

**Esta información va dirigida a población pediátrica,
adolescentes y adultos de edad avanzada**



- ▶ Lea detenidamente el prospecto antes de utilizar el medicamento.
- ▶ Preste atención al medir una dosis pequeña, teniendo en cuenta que para administrar por ejemplo 0,25 mg, es preciso medir 0,25 ml.
- ▶ No utilice un dosificador diferente al facilitado con el medicamento.
- ▶ Después de cada uso, lave el dosificador con agua y deje secar al aire.
- ▶ Si tiene cualquier duda, consulte con su profesional de salud.
- ▶ Busque atención médica inmediata en caso de sobredosis o si aparecen signos o síntomas que la sugieran. Los síntomas de sobredosis incluyen somnolencia, sedación, taquicardia, hipotensión y convulsiones, entre otros.
- ▶ Guarde esta tarjeta en un lugar seguro para poder consultarla cuando tenga dudas.

Puede notificar las reacciones adversas en: www.RAM.navarra.es

